

Impfung gegen Erkrankungen durch Meningokokken Typ B - Bexsero®



PRIVATÄRZTLICHE
PRAXIS FÜR KINDER
UND JUGENDLICHE

DR. MED NADINE SCHEFF

Was sind Meningokokken?

Meningokokken sind Erreger der eitrigen Hirnhautentzündung und der sogenannten Sepsis (schwere überflutende Entzündungsreaktion des Körpers). Auch andere Erreger können diese Krankheitsbilder auslösen. Gegen Pneumokokken und Haemophilus influenza Typ B kann seit längerem geimpft werden (STIKO-Empfehlung bereits im 1. Lebensjahr).

Die Erkrankung tritt sehr selten auf, aber der Krankheitsverlauf ist häufig schwerwiegend. Die allgemeine Sterblichkeit bei invasiven MenB-Erkrankungen liegt in Deutschland bei ca. 8%. Von 2015 bis 2019 wurden in Deutschland insgesamt 59 Todesfälle berichtet.

Die Altersgipfel liegen im 1. bis 4. Lebensjahr und im Jugendalter.

Was sagt die STIKO zur Impfung?

Eine generelle Impfempfehlung gegen Meningokokken Typ B wurde Anfang 2024 für alle Kinder bis zum 5. Geburtstag ausgesprochen und mit in den Impfkalender aufgenommen.

Bei Vorliegen eines erhöhten Risikos für Meningokokken-Erkrankungen sollten alle Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene darüber hinaus mit einem Meningokokken ACWY-Konjugatimpfstoff sowie mit einem Meningokokken-B-Impfstoff geimpft werden. Diese Indikation liegt insbesondere bei einer Immunschwäche vor.

Was ist möglich?

Gegen Meningokokken Typ B kann grundsätzlich in jeder Altersgruppe, unabhängig von der STIKO Empfehlung, geimpft werden. Da insbesondere im Jugendalter ein erhöhtes Erkrankungsrisiko vorliegt, kann eine Impfung gegen Meningokokken Typ B mit Übergang auf die weiterführende Schule (mit 10-12 Jahren) überlegt werden.

Kosten

Wenn Sie die Meningokokken B-Impfung für Ihr Kind ausserhalb der STIKO-Empfehlung wünschen, nehmen Sie bitte zunächst Kontakt mit Ihrer Krankenkasse auf um die Kostenübernahme zu klären. Der Impfstoff kostet z.Z. ca. 122,- €.



PRIVATÄRZTLICHE
PRAXIS FÜR KINDER
UND JUGENDLICHE

DR. MED NADINE SCHEFF

Impfabstände und Durchführung Bexsero ®(Men B)

	1.	2.	3.	4.
2- 5 Monate		Mind. 1 Mo nach 1. Impfung	mit 12-15 Monaten (nach mind. 6 Mo)	nein
6-11 Monate	Tag 0	Mind. 2 Mo nach 1. Impfung	mit ca. 12 - 18 Monaten	nein
12-23 Monate		Mind. 2 Mo nach 1. Impfung	1-2 Jahre nach 2. Impfung	nein
2-10 Jahre	Tag 0	Mind. 2 Mo nach 1.Impfung	nein	nein
ab 11 Jahren	Tag 0	mind. 1 Mo nach 1. Impfung	nein	nein

Es werden Symptome beschrieben, die auch bei anderen Impfungen auftreten können. Aus eigener Erfahrung kommen Lokal- und Fieberreaktionen häufiger vor als bei anderen Standardimpfungen.

Gerne geben wir Ihnen die ausführliche Impfaufklärung des Deutschen Grünen Kreuzes und beantworten Ihre Fragen.Sprechen Sie uns an.

Quelle: www.rki.de/FAQ/Meningokokken und Fachinformation Bexsero®- modifiziert und ergänzt durch Dr. Scheff – Stand 09.02.2025

Die Impfentscheidung liegt bei Ihnen.
Gerne klären wir Fragen in einem persönlichen Gespräch!

Dr. Nadine Scheff und Praxisteam